

ALGAEFORTE

BIOESTIMULANTE



FICHA TÉCNICA

Materia Orgánica	180 g/L
Proteínas	1.8 g/L
Protohormonas	1.4 g/L
Potasio	39 g/L
Calcio	3048 ppm
Magnesio	107 ppm
Cobre	22 ppm
Manganeso	175 ppm
Hierro	738 ppm
Zinc	672 ppm
Zetaina	8.5 g/L
Zeatosina	16.6 g/L
Total Adeninas	25.1 g/L
Total Betaínas	0.85 g/L
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú



Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Aumenta el nivel de clorofila, estimulando un crecimiento saludable.
- Induce resistencia adquirida localizada (LAR) contra un rango de patógenos.
- Contribuye a la nutrición total de la planta.
- Mejora la resistencia a estrés medioambiental y biótico.

APLICACIONES

ALGAFORTE puede ser aplicado en todo tipo de cultivos durante su ciclo de desarrollo. Su uso es básicamente foliar, pero puede ser aplicado al suelo de ser esto requerido.

Se recomienda aplicar **ALGAFORTE** en los estadios iniciales del desarrollo vegetativo del cultivo, así como en el proceso de llenado de los órganos de reserva.

CULTIVO	DOSIS		Momento de aplicación
	L/ 200L	L/Ha	
Algodón	0.5 - 1	1.5 - 2	Después del desahije. Al inicio del botonaje, y en el llenado de las bellotas.
Ají, Tomate	0.75	1.5 - 2	Con 8 a 10 hojas verdaderas. Repetir cada 15 días durante el llenado de frutos. Después de cada paña dentro de las primeras 48 horas.



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe

FICHA TÉCNICA

Arroz	1	1 - 1.5	En almácigo, en plantas con 3 a 6 hojas. Al macollamiento. En "punto de algodón"
Cebolla, Ajos	0.75	1.5 - 2	En almácigo, a los 15 días después de la germinación. 10 días después. Repetir a los 20 o 25 días después de la última aplicación.
Frutales (cítrico, palto)	0.5	3 - 5	Al inicio de brotación. 20 días después del cuajado.
Cucurbitáceas	0.75	1.5 - 2	Con 4 hojas verdaderas. Después de cada paña dentro de las primeras 48 horas.
Leguminosas (frijol, pallar y holantao)	0.5	1.5	A los 30 días después de siembra y al inicio de floración
Lechuga, Espinaca, Brócoli	0.5	1	A los 15 días después del trasplante o siembra.
Maíz	1	1.5 - 2	30 días después de la siembra.
Manzano, Pera	0.5	3	Al inicio de brotación. Cuando los frutos tengan 2.5 cm de diámetro. Repetir a los 15 días.
Melocotón	0.3	3	Después de la caída de los pétalos.
Papa	1	2	Al aporque. Repetir a los 15 días.
Alcachofa	0.5	2	20 días después del trasplante y 6 semanas antes del inicio de la cosecha
Uva de mesa	1	3 - 4	1 era aplicación brote de 8 - 12 cm., 2 da aplicación en pre flor, 3era aplicación en bayas de 5 mm.

TRATAMIENTO DE SEMILLAS: Remojar las semillas de 3 a 5 minutos antes de la siembra o aplicar al fondo del surco, encima de las semillas antes de tapparlas. La solución a aplicar es al 1%.

PRESENTACIONES

1, 5, 20 y 200 L

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar.



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



Descarga nuestra app



Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe