

LABIL PLUS

FUNGICIDA



FICHA TÉCNICA

Dimethomorph	150 g/Kg
Fosetyl-Al	450 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1L
Grupo químico	Morpholina / Sal del ácido fosfórico
Código FRAC	40 / P07(33)
Formulación	Polvo Mojable (WP)
Registro PQUA	Nº 2150 - SENASA
Formulador	Nanjing Essence Fine-Chemical Co., Ltd
Procedencia	China
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Es selectivo y eficaz contra hongos Oomicetos (Mildú y Phytophthora).
- Doble sistemía (xilema y floema).
- Induce mecanismos de defensa natural en las plantas.
- Rápida penetración del activo en todos los órganos de la planta.

APLICACIONES

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o precipitaciones.

Hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua (entre 1/2 y 1/3 del tanque), agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. El equipo debe encontrarse en buenas condiciones.

Al iniciar la preparación de la mezcla agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre para que el Dimetomoph y Fosetyl-Al puedan cumplir con sus características del control, luego agregar la dosis correcta de **LABIL PLUS** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 2-3 minutos, añada el resto de agua manteniendo agitación constante.



Imagen referencial.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS Kg/ha	PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común			
Cebolla	<i>Peronospora destructor</i>	Mildiu	1.5 – 2.0	7	0.6* y 50**
Papa	<i>Phytophthora infestans</i>	Rancha	1.5 – 2.0	7	0.05* y 30**
Vid	<i>Plasmopara viticola</i>	Mildiu	1.5 – 2.0	15	3* y 100**

P.C: Período de carencia en días. L.M.R: Límite máximo de residuos expresados en ppm. *Dimethomoph **Fosetil Aluminio



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe

LABIL PLUS

FUNGICIDA



FICHA TÉCNICA

Época y frecuencia de aplicación:

Se recomienda aplicar LABIL PLUS hasta 2 aplicaciones por campaña, considerando dos campañas el año para el cultivo de cebolla y una campaña al año para el cultivo de papa. Una aplicación por campaña por año para el cultivo de vid. Se considera una frecuencia entre aplicaciones de 10 a 14 días (cebolla) y de 15 a 30 días (papa).

PRESENTACIONES

1Kg y 25Kg.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener
bajo llave



Mantener en lugares
secos y bajo techo



No comer, beber,
ni fumar.



Mantener fuera del
alcance de niños y
animales



Hacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe