

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas a ciertas personas.
- El producto es moderadamente irritante para los ojos, a la piel o el aparato respiratorio.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evitar contacto con la piel y ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Acetanilidas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 SAMU: 106**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No aplicar a menos de 10 m de efluentes de agua.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para las abejas.



# MARISCAL 60 EC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**COMPOSICIÓN:**

Butachlor ..... 600 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 041 - SENASA  
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

## ARIS

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.  
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

**Contenido Neto:**

Lote N°  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



**INFLAMABLE**



**EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MARISCAL 60 EC** es un herbicida pre emergente, sistémico que se utiliza para el control de malezas de hoja ancha, gramíneas y ciperáceas anuales. Posee buen poder residual que permite controlar las malezas por varias semanas, especialmente en los momentos críticos de competencia con el cultivo, los cuales corresponden a las primeras etapas de desarrollo de las plantas de arroz.

Arroz de trasplante: Después del trasplante, aplicar con botella. La aplicación es preferible hacerla con una pequeña lámina de agua o en seco, siempre y cuando se tenga humedad en el suelo. Esta debe hacerse la primera semana después del trasplante antes que emerjan las malezas, después rellenar las pozas y mantenerlas sin desaguar por lo menos de 5 a 7 días. Aplicaciones con malezas muy crecidas puede dificultar el control, por lo que es recomendable hacer la aplicación siempre antes que emerjan las malezas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	MALEZAS		DOSIS (L/ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Arroz (trasplante)	Malezas gramíneas y ciperáceas: Pata de gallina Chapotalla Moco de pavo Canastilla	<i>Eleusine indica</i> <i>Echinochloa colonum</i> <i>Echinochloa crus-galli</i> <i>Cyperus difformis</i>	3 - 4	(*)	0.5
	Malezas de hoja ancha: Verdolaga Campanilla	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Ipomoea sp.</i>	4	(*)	0.5

PC: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos expresado en ppm  
(\*) MARISCAL 60 EC no tiene Período de carencia, porque se aplica una sola vez en la época de trasplante.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar una aplicación por campaña agrícola, en pre-emergencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**MARISCAL 60 EC** por su forma de aplicación no debe mezclarse con ningún fertilizante, fungicida ni insecticida. Es compatible con otros herbicidas.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico a las dosis y usos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

