

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

| COMPOSICIÓN | |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Fósforo (P ₂ O ₅) | 35% |
| Potasio (K ₂ O) | 27% |
| FORMULACIÓN | Concentrado Soluble (SL) |
| FORMULADOR | Aris Industrial S.A. |
| PROCEDENCIA | Perú |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

VACUN-A es un fertilizante foliar concentrado con alto contenido de fósforo y potasio. **VACUN-A** es efectivo para la prevención de enfermedades, ya que actúa estimulando las defensas del hospedante. Gracias a la presencia del ion fosfito actúa como un inductor de fitoalexinas, promoviendo las defensas naturales de las plantas, al potenciar su sistema inmunológico.

VACUN-A mejora la calidad final de las cosechas, pues induce y estimula la multiplicación de los órganos florales y fructíferos; asegurando su cuajado y desarrollo final.

VACUN-A es altamente sistémico y móvil. Se transloca a toda la planta tanto por xilema como por floema. Es una herramienta útil en los programas de manejo integrado y no presenta restricciones de uso.

APLICACIONES

Llene el tanque hasta la mitad con agua de pH 6, agregue la dosis recomendada de **VACUN-A**, agite y añada poco a poco el agua restante, mantener en constante agitación; se recomienda aplicar este tipo de producto solo, pero si es necesario mezclarlo se recomienda el siguiente orden para la mezcla: Agua - Pantera pH - pesticidas - **VACUN-A** y Pantera Wett.

| CULTIVO | DOSIS | | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| | L/200L | L/ha | |
| Leguminosas (Habas, frijol, hortalajo, pallar) | 0.5 | 1 - 2 | 15 días después de la emergencia, pre floración y floración |
| Cítricos (limón, tangelo, naranja, mandarina) | 0.5 - 1 | 2 - 4 | Entre brotación y floración 2 semanas después del cuajado de fruto |
| Frutales (Manzano, durazno, palto, mango, etc.) | 0.5 - 1 | 2 - 3 | Entre brotación y floración 2 semanas después del cuajado del fruto |
| Vid | 0.5 - 1 | 3 - 5 | En brote de 5 a 10 cm, con baya de 5 mm y en tinta |
| Hortalizas (Aji pàprika, pimiento piquillo, tomate) | 0.5 | 1 - 2 | 30 días después de la emergencia. Pre floración. Después del cuajado |

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:



VACUN A

BIOACTIVADOR DE DEFENSAS NATURALES



| CULTIVO | DOSIS | | MOMENTO DE APLICACIÓN |
|---------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| | L/200L | L/ha | |
| Arroz | 0.5 - 1 | 1 - 2 | En almácigo, macollamiento y punto de aladón |
| Espàrrago | 0.5 - 1 | 1 - 2 | A inicios del brotamiento, 7 días después y de 20 a 30 días después |
| Ajo y cebolla | 0.5 | 1 | 15 días después del trasplante, repetir cada 20 días |
| Papa | 0.5 - 1 | 1 - 2 | 30 días después de la emergencia, repetir cada 20 días |
| Palto | 0.5 - 1 | 1 - 2 | Aplicar en brotación y 30 días después del cuajado |

Compatibilidad:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas, no mezclar con productos de reacción alcalina ni con nitratos. Cuando se desconozcan los resultados de una mezcla, hacer una prueba de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad:

No se ha detectado fitotoxicidad en los cultivos recomendados si se emplea a las dosis indicadas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vòmito. En caso de contacto con la piel lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos por unos 10 a 15 minutos, mientras se obtiene asistencia médica.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **VACUN-A** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas. Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de roba, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de roba. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y personas inexpertas. No exponga el producto al sol. Agitar antes de usar el producto. Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado y fuera del alcance de los niños. No verter los restos del producto a cauces de agua; se recomienda enjuagar los envases y agregar a la preparación por aplicar. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajés.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÙ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428

RUC: 20100257298 | vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

