

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse la ropa.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Se recomienda enjuagar el envase con agua y agregar a la mezcla por aplicar. No ingerir el producto.
- Mantenga el producto en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, bajo sombra, y lejos del alcance de los niños.
- No verter los restos del producto en cauces de agua.
- Evitar su transporte en envases inadecuados. No debe ser transportado junto a productos alimenticios y medicinas.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel o la ropa:** Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar abundantemente con agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de cualquier malestar, buscar atención médica.
- Si afecta a los ojos:** Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos. Contactar con un especialista si el malestar persiste.
- Si es ingerido:** Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. Trasladar inmediatamente a un centro médico, si presenta síntomas inusuales.
- Si es inhalado:** Trasladar a la persona a una zona ventilada y respirar aire fresco. Contactar a un médico si presenta malestar.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU: 106

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



# ZINPHOS

Arranque y vigor

APORTA ENERGÍA Y FAVORECE EL  
DESARROLLO VIGOROSO DE LOS CULTIVOS



SAFE FIELDS, Aris garantiza que el producto cumple con las concentraciones mínimas de metales pesados con referencia al Reglamento Unión Europea 2019/1009.

#### AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:  
Lote N°:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:



VITARIS ZINPHOS es una solución concentrada de fósforo, zinc y potasio formulada para brindar energía en estadios iniciales del cultivo, brotación, floración y post cosecha.

#### BENEFICIOS

- Favorece al desarrollo rápido y vigoroso de los cultivos.
- Funciona como un excelente enraizante.
- Aporte directo de energía a la planta.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

#### Composición

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 400 g/L                  |
| Zinc (ZnO)                               | 170 g/L                  |
| Potasio (K <sub>2</sub> O)               | 20 g/L                   |
| FORMULACIÓN                              | Concentrado Soluble (SL) |

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

| Cultivo                                  | Dosis<br>L/200L L/Ha |       | Momento de aplicación  |
|--|----------------------|-------|--|
| Ají, pimiento y rocoto                   | 0.5 - 0.75           | 1 - 2 | Aplicar 15 días después del trasplante o con las primeras 5 hojas verdaderas para siembra directa. Hacer 1 aplicación después de cada cosecha para mejorar el vigor. |
| Alcahofa                                 | 0.5                  | 1 - 2 | Aplicar 20 días después del trasplante y 7 días después del cambio de surco  |
| Arroz                                    | 0.5 - 0.75           | -     | 1 a 2 aplicaciones distribuidas entre 15 y 45 días después del trasplante.   |
| Ajo y cebolla                            | 0.5                  | 1 - 2 | 1 a 2 aplicaciones distribuidas entre el trasplante y 30 días después del mismo.   |
| Frijol y vainita                         | 0.5                  | -     | 1 a 2 aplicaciones antes de la floración, distanciadas 10 días entre sí, desde 15 días después de la siembra.  |
| Maíz                                     | 0.5 - 1              | -     | Aplicar en V3 y V6.  |
| Palto, mango, olivo, arándanos y granada | 0.5 - 0.75           | 2 - 4 | Aplicar 3 a 5 días desde el brotamiento, repetir a los 7 días y a inicio de floración.   |
| Limón, tangelo, naranja y mandarina      | 0.5 - 0.75           | 2 - 4 | Después de la poda y lavado. A la cuaja de los frutos.   |
| Papa                                     | 0.5                  | -     | 15 días antes de la tuberización   |
| Vid                                      | 0.5 - 0.75           | 2 - 4 | Cuando el brote tiene entre 5 y 15 cm, 15 días antes de la floración y en post cosecha.  |
| Café y cacao                             | 0.5 - 1              | -     | Después de la poda, a la cuaja de frutos, después de cada cosecha.   |

#### COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, excepto con los fertilizantes a base de calcio. No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

#### AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:  
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298  
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428  
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

ARIS