

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evítese el contacto con los ojos, piel y ropa. Durante el manipuleo y aplicación usar ropa, máscara y guantes protectores.
- Irritante ocular moderado.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Mantenga este producto en lugar seco, alejado de fuentes de calor y su empaque en perfectas condiciones.
- No transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinas de uso humano o animal.
- Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto.
- No aplicar en dirección contraria al viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Spinosoides.
- **Inhalación.** Retirar a la persona afectada al aire fresco. Si la respiración es dificultosa conseguir ayuda médica inmediatamente. Si no respira, realizar respiración artificial. Mantener a la persona en reposo y abrigada.
- **Piel.** Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar inmediatamente la piel con abundante cantidad de agua y jabón y enjuagar. Lavar las ropas contaminadas antes de reutilizarlas.- **Ojos.** Enjuagar los ojos inmediatamente con abundante cantidad de agua durante por lo menos 15 minutos.
- **Ingestión.** No se recomienda tratamiento específico ya que el producto es de bajo riesgo por ingestión. Si la persona está lúcida, inducir el vómito. No administrar nada por la boca, ni inducir el vómito si la persona está inconsciente. El lavado gástrico debe estar supervisado por personal entrenado.

Consultar al médico.

Tratamiento sintomático: No hay antidoto específico.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106, CISPROMQUIM: 080-050-847

Corteva Agriscience Perú SAC: 421 4811

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para peces, no contaminar ríos, estanques o arroyos, con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de protección para los cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar en suelos con napa freática superficial.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Tracer™ 120 SC

2405

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Spinosad 120 g/L

Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA No. 100-SENASA

Titular del Registro: Corteva Agriscience Perú S.A.C.

Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.

Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

FORMULADO POR:



Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

Calle 113 # 7-21 Torre A, Oficina 1401,

Edificio Teleport Business Park,

Bogotá, D.C. Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima 1, Perú

Tels 3365428 / 3365429. Fax 3367473

CONTENIDO NETO:

LOTE N°:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

© ™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Tracer™ 120 SC es un insecticida formulado a base de Spinosad y que tiene acción oral y por contacto. Llénesse el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el Tracer™ 120 SC agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando.

Aplíquese Tracer™ 120 SC en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

VER CUADRO DE USOS EN LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda hacer dos aplicaciones como máximo por cultivo, rotando con insecticidas de diferente modo de acción para evitar la ocurrencia de resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Mínimo 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Tracer™ 120 SC es compatible con los plaguicidas que se usan normalmente, excepto los de naturaleza alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Se sugiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

