

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación, y para ingresar al área tratada.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No utilizar el producto en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No existe antídoto específico.
- El médico deberá instituir tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: **ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428 SAMU: 106**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar banda de no aplicación de al menos 5 metros hacia fuentes de agua.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE – EC

COMPOSICIÓN:

Abamectin.....18 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Registro PQUA N° 059 – SENASA
Titular de Registro: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS

FORMULADO POR: ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491, Lima - Perú. Telf.: (01) 336 5428

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ABAFIN 1.8 EC es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de diversas plagas agrícolas.

- Aplicar **ABAFIN 1.8 EC** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una premezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGAS		Dosis (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Científico	Nombre Común			
Aji	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	100-150	7	0.01
Mandarina	<i>Phyllocnistis citrella</i>	Minador de cítricos	100-125	7	0.01
	<i>Panonychus citri</i>	Arañita roja	150-250	10	0.01
Palto	<i>Oligonychus punicae</i>	Arañita roja	150	14	0.01
Pimiento	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	150	7	0.02
Alcachofa	<i>Nemomyza maculosa</i>	Mosca minadora	300	9	0.01
Holantao	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	Mosca minadora	250	3	0.01
Vid	<i>Tetranychus urticae</i>	Arañita roja	200	28	0.01
Papa	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	100	14	0.01

PC: Período de Carenia en días.

LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de alcachofa y holantao se recomiendan máximo 3 aplicaciones por campaña. Para los cultivos de palto, vid y papa se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña. Para los cultivos de aji, mandarina y pimiento se recomienda máximo 1 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No entre en las áreas tratadas después de 24 horas de aplicación.

COMPATIBILIDAD

ABAFIN 1.8 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD

ABAFIN 1.8 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

