

GALERNA

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

Ingrediente activo	Glyphosate 757 g/kg
Aditivos	c.s.p 1 kg
Grupo químico	Fosfonoglicina
Grupo HRAC	G
Formulación	Gránulos solubles (SG)
Registro PQUA	N° 2367 - SENASA
Formulador	Sichuan Leshan Fuhua Tongda Agrochemical Technology Co., Ltd
Procedencia	China
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Inhibe la síntesis de proteínas y metabolitos esenciales de las malezas.
- Puede ser aplicado en cualquier época del año, obteniéndose mejores resultados cuando las malezas están en activo crecimiento vegetativo.
- Elimina completamente partes aéreas, raíces, tubérculos y rizomas.
- Los síntomas se observan por aparición de clorosis leve en los tejidos jóvenes y se transforma en necrosis a los 7-14 días después de la aplicación.

APLICACIONES

GALERNA debe aplicarse en solución con agua y asperjarse con el equipo adecuado según las condiciones del cultivo y de la maleza. No usar aguas turbias ni alcalinas en la preparación de la solución herbicida. Si el agua presenta pH alto, usar un agente acidificante, el pH ideal está entre 4 a 5.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre común	Nombre Científico	kg/200L	kg/Ha		
Caña de azúcar	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	-	1 - 2	21	2.0
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Espárrago	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	2	-	5	0.5
	Pega Pega	<i>Setaria verticilata</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>				




Imagen referencial.

GALERNA

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

Mandarina	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	-	1 - 2	1	0.5
	Grama	<i>Leptochloa uninervia</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Palma aceitera	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	1.5 - 2	-	14	0.1
	Kudzu	<i>Pueraria phaseoloides</i>				
	Oreja de ratón	<i>Commelina diffusa</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>				
Palto	Coquito o grama dulce	<i>Cyperus rotundus</i>	1 - 2	1 - 2	1	0.2
	Pega Pega	<i>Setaria verticilata</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Vid	Pega Pega	<i>Setaria verticilata</i>	1 - 2	-	1	0.2
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Hierba del gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>				

P.C.: Período de carencia en días LMR: Límite máximo de residuos.

Gasto de agua: Palto: 225L/Ha, Mandarina, Caña de azúcar y Vid 200L/Ha.

Época y frecuencia de aplicación:

GALERNA puede ser aplicado en cualquier época del año. Una sola aplicación dirigida al follaje cuando se note presencia de maleza en los cultivos mencionados en el cuadro de uso, evitando el contacto con cualquier parte del cultivo objetivo. En los casos de rango de dosis, se recomienda aplicar la menor dosis en malezas pequeñas y la mayor dosis en malezas desarrollas.

PRESENTACIONES

1kg, 10kg y 25 kg

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o dépositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad local, para su gestión

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: 23/08/2024
Versión: 03