

INDAR™ SC

FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Ingrediente activo	Fenbuconazole 246 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L.
Grupo químico	Triazol
Código FRAC	3
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Registro PQUA	N° 2117 - SENASA
Formulador	Corteva Agriscience LLC.
Procedencia	EE. UU.
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso



Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Triple acción de control: preventivo, curativo y protectante.
- Asegura el desarrollo de nuevos brotes sanos.
- Amplia actividad residual y control extendido.
- Rápida penetración en ceras y cutículas (1 hora).

APLICACIONES

Agitar bien el producto antes de usar. Aplicar **INDAR™ SC** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar continuamente y completar el tanque con agua.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			PC	LMR
	Nombre científico	Nombre común	L/Ha	L/200L	%		
Vid	<i>Botrytis cinerea</i>	Botrytis	1.0*	0.15	0.075	63	0.1
Mandarina	<i>Mycosphaerella citri</i>	Mancha grasienta	1.0	0.10	0.054	1	0.5
Arándano	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	Hongos de la madera	1.4	0.54	0.27	30	0.5

PC: Período de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

*Considerando un gasto aproximado de agua de 1500 L/Ha

Época y frecuencia de aplicación:

Las aplicaciones deben hacerse de manera preventiva.

Vid; aplicar previa evaluación de la plaga, considerando la etapa de floración, que es crítica para la presencia de la enfermedad, la aplicación debe de realizarse al momento de la floración.

ARIS

INDAR™ SC

/ FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Mandarina; se recomienda un volumen de agua mayor a 1850 L/ha suficiente para cubrir uniformemente el follaje del árbol. Aplicar mediante bomba de mochila a motor, dirigida al follaje.

Arándano; aplicar en estado de reposo, se sugiere realizar la aplicación a la aparición de los primeros síntomas. Aplicar con un volumen de agua mayor a 520L/ha suficiente para cubrir uniformemente el follaje del árbol. Aplicar mediante bomba de mochila a motor, dirigida al follaje. Realizar 1 aplicación por campaña considerando 1 campaña al año

En general considerar 1 aplicación de **INDAR SC** por campaña, considerando 1 campaña al año.

PRESENTACIONES

1L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: 23/10/2024
Versión: 02