

## KASPER

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

<b>Ingrediente activo</b>	Glufosinato de amonio 200 g/L
<b>Aditivos</b>	c.s.p. 1 litro
<b>Grupo químico</b>	Ácido fosfínico
<b>Grupo HRAC</b>	H
<b>Formulación</b>	Concentrado soluble (SL).
<b>Registro PQUA</b>	N° 2163 - SENASA
<b>Formulador</b>	Exelon Biochem and Advanced Material LTD.
<b>Procedencia</b>	China
<b>Cat. Toxicológica</b>	II - Moderadamente peligroso



Imagen referencial.

## DESCRIPCIÓN

- Herbicida de contacto, post emergente no selectivo.
- De amplio espectro y efectivo control.
- Por su rápida acción inicial, puede usarse como desecante.
- No produce el efecto "pata de gallina" en hojas de vid.

## APLICACIONES

Llenar el tanque de mezcla o el aspersor con la mitad de la cantidad de agua necesaria. Luego agregue la dosis recomendada de **KASPER**, agite la mezcla y complete el volumen de mezcla total con el agua. La aplicación debe garantizar una cobertura uniforme sobre las hojas de las malezas con el caldo de la pulverización. **KASPER** actúa por contacto, por lo cual un correcto mojado de las malezas es esencial.

Dada la cerosidad y vellosidad de algunas malezas, se sugiere adicionar un aditivo del tipo adherente-humectante como PANTERA WETT con el fin de garantizar un mejor control.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/ha	PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común			
Alcachofa	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	2	25	0.1
	<i>Leptochloa filiformis</i>	Cola de zorro			
	<i>Brassica rapa sub sp.</i>	Brassica			
	<i>Campestris</i>				
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león			
	<i>Sonchus oleraceus</i>	Lengua de vaca			
Espárrago	<i>Pennisetum clandestinum</i>	Kikuyo	2.5	1	0.4
	<i>Chenopodium murale</i>	Hierba de gallinazo			
	<i>Setaria vericillata</i>	Pega pega			
	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga			
	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo			

## KASPER

HERBICIDA

FICHA TÉCNICA

<b>Mandarina</b>	<i>Bidens pilosa</i>	Amor seco	3	14	0.1
	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega			
	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga			
	<i>Amaranthus dubius</i>	Yuyo			
<b>Vid</b>	<i>Sorghum halapense</i>	Gramma china	2	14	0.15
	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora			
	<i>Setaria verticillata</i>	Pega pega			
	<i>Portulaca oleracea</i>	Verdolaga			

PC: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

**Época y frecuencia de aplicación:**

Se recomienda la aplicación en la dosis y periodos recomendados, cuando se observa la presencia de malezas en el campo. Aplicar en post-emergencia al observar la presencia de malezas entre 3 y 8 hojas, con humedad en el suelo y malezas en activo crecimiento. Realizar una aplicación por campaña.

## PRESENTACIONES

1L, 20L y 200L.

## CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: [www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: var\_act\_fecha  
Versión: 02