

MASTIL Organic

/ BIOESTIMULANTE

FICHA TÉCNICA

Aminoácidos	37.5 %
Alanina	2.65 %
Arginina	5.09 %
Ácido aspártico	4.01 %
Cisteína	0.18 %
Ácido glutámico	4.82 %
Glicina	2.47 %
Histidina	0.44 %
Isoleucina	0.40 %
Leucina	0.70 %
Lisina	1.05 %
Metionina	0.23 %
Fenilalanina	0.93 %
Prolina	4.07 %
Serina	4.44 %
Treonina	3.59 %
Triptófano	0.05 %
Tirosina	0.34 %
Valina	2.02 %
Nitrógeno total	5.4 %
Formulación	Concentrado Soluble (SL)
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú



Imagen referencial.

BENEFICIOS

- Bioestimulante de origen vegetal con alta concentración de aminoácidos libres de rápida asimilación.
- Promueve la resistencia y recuperación del cultivo al estrés ambiental
- Mejora el transporte de microelementos en la planta.
- Insumo permitido en sistemas agricultura orgánica.

APLICACIONES

CULTIVO	N° de aplicaciones	DOSIS	Momento de aplicación
		(L/200 L)	
Alcachofa	1 - 3	0.3 - 0.6	Al trasplante y repetir 15 días después. Después de la inducción floral 15 días después de siembra.
Papa	3	0.3 - 0.6	20 días antes del inicio de la tuberización y durante la tuberización.
Vid	2 - 5	0.2 - 0.5	2 aplicaciones entre brote de 10 cm y floración 2 a 3 aplicaciones entre postcujaja y envero.

MASTIL Organic

BIOESTIMULANTE

FICHA TÉCNICA

Cebolla, ajo	1 - 3	0.4 - 0.6	15 días después del trasplante; al bulbeo y repetir a los 20 días.
Cítricos, Palto, Mango, Limón Tahití	4	0.3 - 0.5	Antes de floración, con frutos de 2 - 3 cm; repetir aplicaciones cada 20 días.
Hortalizas (tomate, ají, pimiento)	3	0.4 - 0.6	15 días después del trasplante; en floración y al inicio de cosecha.
Banano	3	0.4 - 0.6	En crecimiento vegetativo, a la emergencia del racimo; repetir a los 20 días.
Café, Cacao	3 - 4	0.4 - 0.6	En prefloración, repetir cada 20 días.
Arándano	4 - 5	0.4 - 0.6	Desde brotamiento hasta la pinta.
Duraznero	3 - 4	0.4 - 0.6	Al inicio del brotamiento, repetir cada 20 días.
Arroz	3	0.4 - 0.6	En almácigo; al inicio de macollamiento y en punto de algodón.
Espárrago	4 - 5	0.4 - 0.6	A partir del 2do brote, repetir aplicaciones cada 20 días.
Quinua	3 - 4	0.4 - 0.6	15 días después de la emergencia; al inicio de panojamiento; en aplicación prefloración y en grano lechoso.

Como recomendación general, **MASTIL organic** puede ser aplicado para prevenir o recuperar al cultivo de cualquier situación de estrés, por ejemplo: bajas temperaturas, falta de agua, excesiva carga del cultivo, etc.

PRESENTACIONES

1L, 5L, 20L y 200 L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 01/01/2024
Versión: 01