

ARIS

PANTERA 720 GOLD

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Ingredientes activos	Azufre 520 g/L Abamectina 2g/L
Aditivos	c.s.p. 1L
Grupo químico	Inorgánico y Avermectinas
Clasificación IRAC	UN / 6
Formulación	Suspensión concentrada (SC)
Registro PQUA	N° 1718 - SENASA
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Doble efecto de control: Insecticida - Acaricida.
- Excelente control en aplicaciones preventivas o infecciones iniciales.
- Ayuda a evitar el desarrollo de resistencias, ideal para programas MIP.
- Actúa en fase de vapor, incrementando la dispersión.

APLICACIONES

Aplicar **PANTERA 720 GOLD** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. Al iniciar la preparación de la mezcla agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requieren los activos para cumplir con sus características de control, luego agregar la dosis correcta de **PANTERA 720 GOLD** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 23 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante.



Imagen referencial.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común	L/ha	L/200 L		
Mandarina	<i>Panonychus citri</i>	Araña roja	2.8 - 3.3 ^a	1.00 - 1.20	9	0.04 ^c
	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Acaro del tostado	-	1.50		NA ^d
Palto	<i>Oligonychus peruvianus</i>	Araña roja	-	1.00	14	0.02 ^c NA ^d
Pimiento	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino	-	1.00	7	0.09 ^c NA ^d
Fresa	<i>Tetranychus urticae</i>	Araña roja	-	1.00	3	0.15 ^c NA ^d
Arroz	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	Ácaro	-	1.0 - 1.20	7	0.01 ^c NA ^d

PANTERA 720 GOLD

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Mango	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	Araña bimaculada		1.00 – 1.20	7	0.01 ^c NA ^d
Vid	<i>Tetranychus urticae</i>	Araña roja	-	1.00 – 1.50	28	0.03 ^c NA ^d
	<i>Colomerus vitis</i>	Ácaro		1.00 – 1.50	28	0.03 ^c NA ^d
Limón	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Ácaro del tostado	4.0-6.0 ^b	1.00 - 1.50	7	0.04 ^c NA ^d
Arándano	<i>Oligonychus punicae</i>	Ácaro		1.00 – 1-50	21	0.05 ^c NA ^d
Granado	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Ácaro hialino		1.00 – 1-50	7	0.01 ^c NA ^d

PC: Período de carencia en días; LMR: Límite máximo de residuos en ppm; NA: No aplica. ^aGasto de agua: 560 L/ha; ^bGasto de agua: 800 L/ha
^cAbamectina ^dAzufre

Época y frecuencia de aplicación:

Se recomienda una frecuencia de aplicación de 10 días, en época de alta presión de la plaga y de acuerdo con el ciclo de vida.

Para cultivos de una campaña/año se recomienda como máximo: pimiento y fresa hasta 6 aplicaciones; en arándano hasta 4 aplicaciones; en mandarina, palto, limón, mango, vid y granado hasta 3 aplicaciones; para dosis bajas de mandarina hasta 6 aplicaciones; y en el cultivo de arroz con 2 campañas/años se recomienda hasta 6 aplicaciones.

Asimismo, implementar la rotación de otros ingredientes activos para control integral de plagas

PRESENTACIONES

Envases de 1L, 4L, 5L, 20L y 200L

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares
secos y bajo techo



No comer, beber,
ni fumar



Mantener fuera del
alcance de niños y
animales



Hacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 15/01/2025 | Fecha de revisión: 19/02/2026

Versión: 04