

PODIUM 250 EW

FUNGICIDA



FICHA TÉCNICA

Tebuconazole	250 g/L
Aditivos	Hasta completar 1 L.
Grupo químico	Triazoles
Código FRAC	3
Formulación	Emulsión aceite en agua (EW)
Registro PQUA	Nº 287 - SENASA
Formulador	Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd
Procedencia	China
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso



DESCRIPCIÓN

- Amplio espectro de acción en hongos fitopatógenos, principalmente en royas y oídios.
- Excelente translocación y redistribución en la planta.
- Emulsión estable que facilita el manejo y dilución.
- Bajo riesgo de fitotoxicidad.

APLICACIONES

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o precipitaciones.

Al iniciar la preparación de la mezcla agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requiere el Tebuconazole para cumplir con sus características de control, luego agregar la dosis correcta de **PODIUM 250 EW** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 2-3 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común	ml/ha	ml/ 200 L		
Espárrago	<i>Puccinia asparagi</i>	Roya	300 - 500	100 - 170*	18	0.05
Vid	<i>Erysiphe necator</i>	Oidiosis	-	60	14	2
Alcachofa	<i>Leveillula taurica</i>	Oidium	500**	-	7	0.5
Pimiento	<i>Leveillula taurica</i>	Oidium	500	-	3	0.6
Mandarina	<i>Botrytis cinerea</i>	Moho gris	-	200	13	5
Arándano	<i>Thekopsora minina</i>	Roya	-	200	7	1.5

* Considerando un gasto de agua de 3 cilindros/ha. **El gasto de agua recomendado es de 700 L/ha. PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.

Época y frecuencia de aplicación:

Para los cultivos de espárrago y pimiento se recomiendan 2 aplicaciones por campaña. Aplicar a la aparición de los



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe

PODIUM 250 EW

FUNGICIDA



FICHA TÉCNICA

primeros síntomas de la enfermedad.

Para los cultivos de vid y mandarina se recomienda una aplicación por campaña por año. Realizar aplicación foliar según aplicaciones del cultivo y/o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Para el cultivo de arándano se recomienda una aplicación por campaña por año. Realizar la aplicación durante la etapa de crecimiento vegetativo hasta cuajado de fruto, ante los primeros indicios de ataque de la enfermedad.

PRESENTACIONES

250 ml, 500 ml, 1L, 4 L, 20 L y 200 L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener
bajo llave



Mantener en lugares
secos y bajo techo



No comer, beber,
ni fumar.



Mantener fuera del
alcance de niños y
animales



Hacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.



Descarga nuestra app



ARISagro

Síguenos como ARISagro en:



aris.com.pe