

RADIAM 5.7

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Emamectin Benzoato	57 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg
Grupo químico	Avermectinas
Clasificación IRAC	6
Formulación	Granos Dispersables (WG)
Registro PQUA	N° 1743 - SENASA
Formulador	Ningbo Sunjoy Agrosience Co., Ltd.
Procedencia	China
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso




Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Doble efecto de control: Contacto e ingestión.
- Actividad translamina que proporciona una rápida penetración.
- Excelente eficacia sobre larvas lepidópteras.
- Baja toxicidad en insectos benéficos, ideal para programas MIP.

APLICACIONES

Aplicar **RADIAM 5.7** en aspersión, previa mezcla con agua, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor. Para preparar la mezcla, pre-mezclar **RADIAM 5.7**, agregarlo al tanque del equipo aplicador con agua hasta la mitad de su capacidad, mientras funciona el agitador. Una vez diluido el producto, completar el volumen de la pre-mezcla deseada en el tanque. Agitar la mezcla antes y durante la aplicación. La dosis recomendada en el cultivo de vid es de 0.19-0.22 Kg/ha de **RADIAM 5.7** con un gasto de agua de 550 L/ha.

Al iniciar la preparación de la mezcla se recomienda agregar **LI 700** en el tanque para mejorar la cobertura y penetración de la aplicación, así como regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requiere Emamectin Benzoato para cumplir con sus características de control, luego agregar la dosis correcta de **RADIAM 5.7**.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	kg/ha	kg/200L		
Espárrago	<i>Heliothis virescens</i>	Gusano de hoja	0.175-0.2	-	7	0.01
	<i>Copitarsia decolora</i>	Gusano de tierra	0.2	-		
Maíz	<i>Spodoptera frugiperda</i>	Gusano cogollero	0.15	-	7	0.01
Palto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	Gusano del cesto	0.3	-	3	0.01
Pimiento	<i>Heliothis virescens</i>	Gusano de hoja	0.2	-	3	0.02
Arroz	<i>Diatraea saccharalis</i>	Barreno de la hoja	0.2	-	30	0.01

RADIAM 5.7

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

Vid	<i>Pholus ampelophaga</i>	Gusano de la vid	0.19-0.22*	0.07-0.08	7	0.03
Alcachofa	<i>Heliothis virescens</i>	Gusano perforador grande de la bellota	0.15-0.175	-	30	0.1

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Limite máximo de residuos en ppm

*Gasto de agua 550 L/ha

Época y frecuencia de aplicación:

Aplicar tan pronto se observen los primeros estadios larvales de la plaga. Se recomienda realizar máximo una 1 aplicación por campaña, teniendo como máximo 2 campañas por año.

PRESENTACIONES

100g, 200g, 500g, 1kg y 25kg

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.