

## RALLY 2 EC

FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

<b>Myclobutanil</b>	240 g/L
<b>Aditivos</b>	c.s.p 1 L.
<b>Grupo químico</b>	Triazoles
<b>Código FRAC</b>	3
<b>Formulación</b>	Concentrado emulsionable (EC)
<b>Registro PQUA</b>	Nº 774 - SENASA
<b>Formulador</b>	Corteva Agriscience Italia S.r.l.
<b>Procedencia</b>	Italia
<b>Cat. Toxicológica</b>	II - Moderadamente peligroso



Imagen referencial.

## DESCRIPCIÓN

- Fungicida sistémico de acción preventiva y curativa.
- Actúa en fase de vapor, mejorando la distribución en la planta.
- Rápida absorción que disminuye el lavado por lluvias.
- Protege brotes nuevos hasta 4 días después de la infección.

## APLICACIONES

Agite bien el producto antes de usar. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua. Aplicar **RALLY 2 EC** en aspersión, con pulverizadoras manuales, mecánicas o accionadas por tractor.

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando la mayor radiación solar, fuertes vientos o precipitaciones. La cobertura de las mismas debe ser lo suficientemente buena de tal forma que cubra total y de manera uniforme todo el cultivo, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS L/Ha	PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común			
<b>Capsicum annuum</b>	<i>Leveillula taurica</i>	Oidio	0.4 - 0.5	3	0.5
<b>Alcachofa</b>	<i>Leveillula taurica</i>	Oidio	0.35	14	0.9
<b>Vid</b>	<i>Erysiphe necator</i>	Oidio	0.4	14	1
<b>Melón</b>	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	Oidio	0.3	5	0.2
<b>Arroz</b>	<i>Helminthosporium oryzae</i>	Helminthosporium	0.25	15	0.03
<b>Papa</b>	<i>Alternaria solani</i>	Tizón temprano	0.4 - 0.5	7	0.02

ARIS

## RALLY 2 EC

/ FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

**Melocotón***Sphaerotheca pannosa*

Oidium

0.3

1

2

*PC: Periodo de carencia en días. LMR: Límite máximo de residuos expresados en ppm.***Época y frecuencia de aplicación:**

Realizar máximo 02 aplicaciones de **RALLY 2 EC** por campaña, considerando 1 campaña al año. La aplicación debe de realizarse al presentarse los síntomas iniciales de la enfermedad. El intervalo de aplicación es de 14 días.

## PRESENTACIONES

0.25 L, 0.5L, 1L, 4L y 200 L.

## CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE



Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: [www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)

*Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.*