

SULFER X-80

/ FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Azufre	800 g/Kg
Aditivos	C.S.P. 1Kg
Grupo químico	Inorgánico
Formulación	Polvo seco (DP)
Registro PQUA	Nº 277 - SENASA
Formulador	Aris Industrial
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	III - Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Acción fungicida, acaricida y repelente de insectos.
- Nutriente estructural de compuestos orgánicos en la planta.
- No ocasiona daños al cultivo ni a insectos beneficiosos.
- Registro orgánico.

APLICACIONES

El producto puede ser utilizado siguiendo las dosis recomendadas, sin embargo es preferible no aplicar cuando se presentan temperaturas ambientales mayores a 35 °C. De preferencia aplicar temprano en las mañanas o pasadas las altas temperaturas de la tarde. La efectividad del azufre alcanza su óptimo control entre 25 y 30 °C, asimismo es favorecida por condiciones de aire seco y ausencia de vientos.



Imagen referencial.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ha	PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común			
Arándano	<i>Thekopsora minima</i>	Blueberry leaf rust	35 - 50	NA	NA
Limón	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Acaro del tostado	40 - 50	NA	NA
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	30	NA	NA
Mandarina	<i>Prodiplosis longifila</i>	Mosquilla de los brotes	30 - 40	NA	NA
	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	Acaro hialino	70 - 80	NA	NA
	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	Acaro del tostado	70 - 80	NA	NA

SULFER X-80

/ FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Vid	<i>Uncinula necator</i>	Oidium	18 - 27	NA	NA
Palto	<i>Oligonychus punicae</i>	Ácaro	70 - 80	NA	NA

PC: Periodo de Carencia

L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm.

NA: No aplica

Época y frecuencia de aplicación:

Iniciar las aplicaciones al primer signo de infestación del hongo o del ácaro para prevenir y controlar el ataque sobre el campo de cultivo. La frecuencia de aplicaciones puede variar en función a las condiciones climáticas y a la presencia de la enfermedad en el campo, pero una frecuencia adecuada puede ser entre 7 y 10 días entre aplicaciones. Realizar un máximo de 3 aplicaciones/campaña/año No aplicar en época de floración. No aplicar con temperaturas mayores a 30°C

PRESENTACIONES

El azufre SULFER X-80 se comercializa en bolsas de polietileno cosidas, con un contenido neto de 15 kg.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.