

TROPA SC

INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Fipronil | 200 g/L |
| Lufenuron | 50 g/L |
| Aditivos | c.s.p. 1L |
| Grupo químico | Fenilpirazoles / Benzoyl ureas |
| Clasificación IRAC | 2 / 15 |
| Formulación | Suspensión concentrada (SC) |
| Registro PQUA | N° 1045 - SENASA |
| Formulador | Ningbo Sunjoy Agroscience Co., Ltd |
| Procedencia | China |
| Cat. Toxicológica | II - Moderadamente peligroso |



Imagen referencial.

DESCRIPCIÓN

- Mezcla estratégica que otorga amplio espectro de acción.
- Excelente efecto de choque inicial y residual.
- Prolongado tiempo de control.
- Versatilidad de aplicación: foliar, suelo, siembra directa.

APLICACIONES

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

Al iniciar la preparación de la mezcla en tanque agregar primero el coadyuvante **Pantera pH** para mejorar las condiciones físicas y químicas del agua y agregar la dosis correcta de **TROPA SC** y otros agroquímicos (si fuera el caso). Agite durante 2-3 minutos, añada el resto del agua manteniendo agitación constante y finalmente agregar el surfactante organosiliconado **EASYWAY**. Recomendamos regular el pH del agua entre 5 y 6, que es el que requiere el Fipronil y Lufenuron para cumplir con sus características de control.

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC | LMR |
|------------------|------------------------------|-------------------|---------|------|----|---------------------|
| | Nombre Científico | Nombre común | L/cil | L/Ha | | |
| Esparrago | <i>Heliothis virescens</i> | Gusano perforador | 0.2-0.3 | - | 28 | 0.005 |
| Arroz | <i>Hydrellia wirthy</i> | Mosca minadora | 0.20- | - | 15 | (a)0.005 (b)0.02 |
| | <i>Spodoptera frugiperda</i> | Gusano cogollero | 0.25 | | | |

P.C: Período de carencia en días. (a) Fipronil (b) Lufenuron L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm.

Época y frecuencia de aplicación:

Para todos los cultivos debe aplicarse cuando aparece la plaga o antes de llegar al nivel de daño económico. Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña, considerando 1 campaña al año.


TROPA SC

/ INSECTICIDA

FICHA TÉCNICA
PRESENTACIONES

0.25L y 1L.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE


Mantener bajo llave


 Mantener en lugares
secos y bajo techo

 No comer, beber,
ni fumar

 Mantener fuera del
alcance de niños y
animales

 Hacer uso de EPP
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.