



"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PANTERA PROCESADO

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Azufre930 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

REGISTRO PQUA N°024 - SENASA
TITULAR DEL REGISTRO: ARIS INDUSTRIAL S.A.

ARIS

FABRICADO Y FORMULADO POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.
RUC: 20100257298
AV. INDUSTRIAL 491, LIMA - PERÚ
TELÉFONO: (01) 336 5428

CONTENIDO NETO

25 Kg

PRODUCTO PERUANO



CORROSIVO



INFLAMABLE



EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



PANTERA PROCESADO
AZUFRE DE USO AGRÍCOLA



PANTERA PROCESADO
AZUFRE DE USO AGRÍCOLA





Pantera

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Durante la aplicación, manipuleo o mezcla del producto usar máscara, guantes, ropa apropiada y no comer, beber, ni fumar.
- Evitar inhalar la nube de polvo y contacto con la piel, el producto causa irritación a la nariz, garganta y ojos.
- Terminada la aplicación, lavarse con abundante agua, jabón y cambiarse de ropa y lave la ropa contaminada.
- Mantener el producto alejado de los niños y animales domésticos.
- No almacene ni transporte con productos alimenticios, medicinas, bebidas, semillas, forrajes o piensos, etc. El producto debe ser transportado en un embalaje adecuado y no conjuntamente con los alimentos, bebidas, medicinas de uso humano o animal; su almacenamiento debe hacerse en lugares techados, frescos y bien ventilados.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inorgánico
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El producto no tiene antídoto específico. Se recomienda tratamiento sintomático.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 ARIS INDUSTRIAL S. A.: (01) 336 5428

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para animales domésticos.
- Peligroso para abejas.
- Peligroso para peces.
- No contaminar las fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos, ni con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Para animales domésticos manténgalos fuera de las zonas tratadas al menos durante 24 a 48 horas después de la aplicación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PANTERA PROCESADO es un acaricida fungicida formulado en polvo seco para la prevención de ciertas enfermedades fungosas y el control de ácaros y repelencia de insectos plaga, contemplados en el cuadro de dosis. Se recomienda aplicar temprano por la mañana o al atardecer, evitando la presencia de vientos y la alta radiación solar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| Cultivo | Nombre Común | Nombre Científico | Dosis (Kg/Ha) | PC (días) | LMR (ppm) |
|---|--|---|---------------|-----------|-----------|
| Algodón | Oidium Arañita roja | <i>Erysiphe malachrae</i> <i>Tetranychus urticae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Vid | Oidium Trips Ácaro Arañita roja | <i>Uncinula necator</i> <i>Thrips sp.</i> <i>Eriophyes vitis</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i> | 18-27 | N.A. | N.A. |
| Espárrago | Arañita roja | <i>Puccinia asparagi</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus cinnabarinus</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i> | 40-60 | N.A. | N.A. |
| Melocotón | Oidium | <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Zapallo Sandía Melón Pepinillo | Oidium Arañita roja | <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Tetranychus urticae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Frijol Arveja | Oidium Arañita roja | <i>Erysiphe cichoracearum</i> <i>Tetranychus sp.</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Mango | Oidium | <i>Oidium mangiferae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Ají | Oidium Ácaro hialino Arañita roja | <i>Erysiphe polygoni</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Tetranychus urticae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Papa | Mosquilla Ácaro hialino Oidium Arañita roja | <i>Prodiplosis longifila</i> <i>Polyphagotarsonemus latus</i> <i>Oidium sp.</i> <i>Tetranychus urticae</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Manzano | Oidium | <i>Podosphaera leucotricha</i> | 25-30 | N.A. | N.A. |
| Higo | Arañita roja | <i>Oligonychus peruvianus</i> | 25-50 | N.A. | N.A. |
| Pimiento | Ácaro hialino | <i>Polyphagotarsonemus latus</i> | 30-60 | N.A. | N.A. |
| Paprika | Mosquilla de los brotes | <i>Prodiplosis longifila</i> | 30-40 | N.A. | N.A. |
| Arándano | Arañita roja | <i>Tetranychus urticae</i> | 30-60 | N.A. | N.A. |
| | Roya del arándano | <i>Thekopsora sp.</i> | 35 - 50 | N.A. | N.A. |

LMR: (Límite máximo de residuos) PC: Periodo de carencia N.A.: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

• Iniciar las aplicaciones a los primeros signos de infestación para prevenir y controlar el ataque sobre el cultivo. Para arándano, aplicar en la etapa fenológica de desarrollo vegetativo. • Realizar máximo una aplicación por campaña, siendo dos campañas al año en los cultivos de pimiento, paprika y espárrago. Realizar máximo una aplicación por campaña, una (01) campaña al año en el cultivo de arándano. • NO REALIZAR APLICACIONES DURANTE EL PERIODO DE FLORACIÓN DE LOS CULTIVOS.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no volver a entrar al sector tratado, hasta que la aplicación se haya secado o hayan pasado 24 horas desde la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de plaguicidas excepto con aceites de uso agrícola, dinitrocresoles, nitrocresoles, sustancias alcalinas, mercuriales y arsenicales, los cuales no se deben de mezclar bajo ningún motivo. No aplique aceites agrícolas minerales durante los 21 días anteriores o posteriores a la aplicación de azufre.

FITOTOXICIDAD: PANTERA PROCESADO no es fitotóxico, siempre y cuando se utilice en los cultivos y dosis que recomendamos, también se debe considerar la compatibilidad con otros productos para evitar efectos de fitotoxicidad. No aplicar con temperaturas ambientales mayores a 30 °C.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor.

