

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN (p/v)	
Fósforo (P ₂ O ₅)	400 g/L
Zinc (ZnO)	170 g/L
Potasio (K ₂ O)	20 g/L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
FORMULADOR	Aris Industrial S.A.
PROCEDENCIA	Perú

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pantera ZINPHOS presenta un balance ideal de fósforo y zinc, haciendo que la acción de estos sea sinérgica. Además ambos elementos están vinculados directamente con el desarrollo del sistema radicular, lo cual permite que la planta pueda iniciar de manera más rápida y con mayor vigor su desarrollo.

Pantera ZINPHOS funciona como un excelente enraizante, el cual debe ser aplicado en los estadios iniciales en los cultivos hortícolas, y en los momentos de brotación, floración y postcosecha de los frutales. El fósforo presente en **Pantera ZINPHOS** es un aporte directo de energía a la planta, y el zinc es un precursor de auxinas, por lo que ambos elementos favorecen también la floración de los cultivos.

APLICACIONES

Pantera ZINPHOS puede aplicarse tanto de manera foliar como en aplicaciones al suelo, vía drench o por sistema de riego.

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Ají, pimiento, rocoto	0.5 - 0.75	1 - 2	Aplicar 15 días después del trasplante o con las primeras 6 hojas verdaderas para siembra directa. Hacer 1 aplicación después de cada cosecha para mejorar el vigor
Alcachofa	0.5	1 - 2	Aplicar 20 días después del trasplante y 7 días después del cambio de surco
Arroz	0.5 - 0.75	-	1 a 2 aplicaciones distribuidas entre 15 y 45 días después del trasplante
Ajo, cebolla	0.5	1 - 2	1 a 2 aplicaciones distribuidas entre el trasplante y 30 días después del mismo
Leguminosas (frijol, vainita)	0.5	-	1 a 2 aplicaciones antes de la floración, distanciadas 10 días entre sí, desde 15 días después de la siembra
Maíz	0.5	-	1 a 2 aplicaciones antes de la floración, distanciadas 10 días entre sí, desde 15 días después de la siembra

Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto:

Pantera

ZINPHOS
ENRAIZANTE

FERTILIZANTE FOLIAR LÍQUIDO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS
INDUSTRIAL

APLICACIONES

CULTIVO	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	L/ha	
Palto	0.5 - 0.75	2 - 4	2 a 3 aplicaciones al inicio de la floración e inicio de la brotación
Cítricos	0.5 - 0.75	2 - 4	Después de la poda y lavado A la cuaja de los frutos
Papa	0.5	-	15 días antes de la tuberización
Vid	0.5 - 0.75	2 - 4	Cuando el brote tiene entre 5 y 15 cm, 15 días antes de la floración y en post cosecha

La dosis por hectárea indicada en el cuadro de usos es para aplicación por vía foliar, en caso de hacer la aplicación vía fertirriego se recomienda aumentar la dosis de la tabla en un 20% y si la aplicación se realizará vía drench, el incremento debe ser del 50%.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas, es recomendable no mezclar con nitrato de calcio, sulfato de hierro en solución, abonos que contengan calcio o con cualquier otro fertilizante que contenga microelementos en solución (no quelatados).

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos unos 10 a 15 minutos, mientras se obtiene asistencia médica.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **Pantera ZINPHOS** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas, en especial las descritas para los pesticidas que se aplican en la mezcla.

Manipulación: Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No exponga el producto al sol ni a temperaturas extremas.

Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No verter los restos del producto a cauces de agua, se recomienda enjuagar el envase y agregar a la preparación por aplicar. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas ni forrajes.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428
RUC: 20100257298 | vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

