

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

COMPOSICIÓN	
Boro (B ₂ O ₃)	120 g/L
L-α-aminoácidos	12.5 g/L
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)
FORMULADOR	Aris Industrial S.A.
PROCEDECIA	Perú

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PLEX BORO es un fertilizante a base de boro complejo con etanolamina, que es un compuesto orgánico que permite mejorar la solubilidad, absorción y movilidad del boro en la planta. El producto está enriquecido con aminoácidos, los cuales mejoran el transporte de azúcares a través de las membranas y estimulan el crecimiento de los meristemas apicales.

PLEX BORO favorece y mejora el cuajado de los frutos, disminuye los efectos fisiológicos negativos como la degeneración de los tejidos meristemáticos, reduce los frutos de cáscara muy gruesa, evita la aparición de turiones de espárrago deformes, corazón hueco en brócoli y papa, así como racimos de uva con pocos granos y tamaño desuniforme.

PLEX BORO también controla el movimiento de azúcares y almidones de las hojas al fruto, reduce la caída de flores y frutos, y evita la presencia de frutos pequeños deformes, sin sabor y corchosos en cultivos como el tomate, ají, manzana y cítricos.

PLEX BORO estimula la germinación y crecimiento del tubo polínico, esto aumenta el amarre de flores y frutos. También está asociado con la actividad celular que promueve la maduración y estimula el crecimiento radicular y de la parte aérea.

APLICACIONES

Se recomienda aplicar en forma preventiva en brotación y floración en cultivos sensibles a la carencia de boro o en cualquier momento del ciclo vegetativo si aparecen síntomas de carencia. Es recomendable aplicarlo vía foliar en cultivos sembrados en suelos con deficiencia de boro.

CULTIVO	DOSIS L/200L L/ha		MOMENTO DE APLICACIÓN
Leguminosas (frijol, holantao)	0.25 - 0.5	0.75 - 1	En pre floración, repetir la aplicación a los 20 días
Frutales caducifolios (manzano, peral, durazno, nectarino)	0.5 - 1	1 - 3	Aplicar en pre floración, repetir la aplicación a inicios de desarrollo del fruto
Cítricos	0.5 - 1	1 - 4	Aplicar en pre floración. Realizar al menos 2 aplicaciones en post cuaja, a las 2 semanas y a las 4 semanas
Vid	0.5 - 0.75	1 - 2	Aplicar 14 días antes de la floración
Palto	0.5 - 1	1 - 3	Aplicar en pre floración, repetir a los 15 días
Café, cacao	0.5 - 1	1.5 - 2.5	En pre floración, 40 días después del cuajado de frutos
Hortalizas (capsicum y tomate)	0.5 - 0.75	1 - 1.5	7 días antes de la floración, repetir la aplicación 10 días después

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

PLEX BORO

PRODUCTO COMPLEJADO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:

APLICACIONES

CULTIVO	DOSIS L/200L L/ha		MOMENTO DE APLICACIÓN
	Cucurbitáceas	0.5 - 0.75	
Arroz	0.25 - 0.5	1	Al final del macollaje e inicio de floración, repetir en "punto de algodón" y llenado de grano
Espárrago	0.5 - 0.75	1 - 1.5	60 días antes del chapodo, repetir la aplicación a los 15 días
Ajo y cebolla	0.5 - 0.75	1 - 1.5	10 días antes del bulbeo, repetir a los 15 días
Papa	0.25 - 0.3	0.5 - 1	20 días antes de la formación del tubérculo, repetir en plena tuburización
Camote	0.25 - 0.3	0.5 - 1	15 días después del trasplante y 20 días antes del inicio de llenado de rizomas
Algodón	0.25 - 0.5	1 - 2	Después del desahije y 15 días antes de la aparición de los primeros botones florales
Alcachofa	0.5 - 1	1 - 2	Aplicar a la formación de los capítulos florales

Preparación de la mezcla: Agite bien el envase antes de usar.

Para preparar la mezcla, llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada de **PLEX BORO**, agite y añada poco a poco el agua restante, mantener en constante agitación. Se recomienda preparar la mezcla en el siguiente orden: Agua, Pantera pH, pesticidas, **PLEX BORO** y Pantera Wett.

Compatibilidad y fitotoxicidad: **PLEX BORO** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. Se recomienda realizar una prueba antes de mezclar. Evite mezclar con ácidos y agentes oxidantes. No causa fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

PRIMEROS AUXILIOS

Si el producto fuera ingerido, beber abundante agua e inducir al vómito. En caso de contacto con la piel, lavar completamente las áreas afectadas con agua y jabón; los ojos deben ser lavados con abundante agua fresca por lo menos unos 10 a 15 minutos, mientras se obtiene asistencia médica.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Si bien **PLEX BORO** es un producto de baja toxicidad, se recomienda seguir las precauciones normales en el uso de plaguicidas, en especial las descritas para los pesticidas que se aplican en la mezcla.

Manipulación: Durante su manipulación, evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse de ropa. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Almacenaje: Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. No exponga el producto al sol ni a temperaturas extremas.

Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un lugar fresco y ventilado. No verter los restos del producto a cauces de agua, se recomienda enjuagar el envase y agregar a la preparación por aplicar. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas ni forrajeados.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:

ARIS INDUSTRIAL S.A.

Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf.: (01) 336 5428

RUC: 20100257298 | vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

