

## SARUTA

FUNGICIDA  
BIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ingrediente activo</b> | Carvacrol 10 g/L                        |
| <b>Aditivos</b>           | c.s.p. 1 L                              |
| <b>Grupo químico</b>      | Extracto de orégano                     |
| <b>Formulación</b>        | Concentrado soluble (SL)                |
| <b>Registro PQUA</b>      | N° 0210-SENASA-PBA-EV                   |
| <b>Formulador</b>         | Inner Mongolia Kingbo Biotech Co., Ltd. |
| <b>Procedencia</b>        | China                                   |
| <b>Cat. Toxicológica</b>  | III Ligeramente peligroso               |



Imagen referencial.

## DESCRIPCIÓN

- Fungicida biológico de vanguardia.
- Certificación orgánica
- Acción por contacto: Actúa directamente en la membrana celular de los hongos.
- Debilita y destruye los hongos al desestabilizar su membrana.
- SARUTA se destaca por su fórmula única que incluye carvacrol, un compuesto natural ampliamente reconocido por su acción antifúngica.

## APLICACIONES

Hacer una premezcla: Llenar el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, agregar la dosis correcta de **SARUTA**, agite durante 2-3 minutos y luego agregar el resto de agua. Mantener en agitación constante. Procure que el producto tenga CONTACTO con la enfermedad, asimismo que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan una buena COBERTURA, de sitios donde se localizan.

| CULTIVO         | PLAGA                     |              | Dosis<br>L/200L | PC  | LMR |
|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------|-----|-----|
|                 | Nombre Científico         | Nombre común |                 |     |     |
| <b>Vid</b>      | <i>Erysiphe necator</i>   | Oidiosis     | 0.75 – 1.0      | N.A | N.A |
| <b>Pimiento</b> | <i>Leveillula taurica</i> | Oidium       | 0.8 - 1.0       | N.A | N.A |
| <b>Arándano</b> | <i>Botrytis cinerea</i>   | Moho gris    | 0.8 - 1.0       | N.A | N.A |

P.C: Periodo de carencia en días L.M.R: Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No aplica

## Época y frecuencia de aplicación:

Se aplica cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno o al inicio de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda aplicar máximo 3 veces por campaña, con un intervalo de 7 días. Rotar luego con un plaguicida con modo de acción diferente.

ARIS

SARUTA

FUNGICIDA  
BIOLÓGICO

FICHA TÉCNICA

**Compatibilidad:**

Compatible con la mayoría de los plaguicidas, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

**PRESENTACIONES**

0.5L, 1L, 5L, 20L y 200L

**CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE**

Mantener bajo llave



Mantener en lugares  
secos y bajo techo



No comer, beber,  
ni fumar



Mantener fuera del  
alcance de niños y  
animales



Hacer uso de EPP  
(Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: [www.campolimpio.org.pe](http://www.campolimpio.org.pe)

*Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.*

Fecha de emisión: 23/08/2024 | Fecha de revisión: 12/12/2024  
Versión: 03