

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



PELIGRO

Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
Recoger los vertidos.
Eliminar el contenido/ recipiente.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo con:

- **Contacto con la piel:** Enjuagar la piel con agua durante 15-20 minutos. En caso de irritación cutánea: consultar a un médico.
- **Contacto con los ojos:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante 15-20 minutos. Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- **Ingestión:** Enjuagarse la boca. No provocar el vómito. Llamar a un centro médico si la persona se encuentra mal.
- **Inhalación:** Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración. Llamar a un centro médico si la persona se encuentra mal.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



SULFATO DE COBRE
organic
BIOESTIMULANTES

CC emitido por KIWA BCS, producto compatible con (CE) N° 889/2008 (UE), NOP 7 CFR Part. 205 y JAS/MAF para uso de cultivos orgánicos como Fertilizante.



SAFE FIELDS, Aris garantiza que el producto cumple con las concentraciones mínimas de metales pesados con referencia al Reglamento Unión Europea 2019/1009.



AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



VITARIS SULFATO DE COBRE es una solución concentrada de sulfato de cobre, con certificación orgánica. Diseñado para ser utilizado vía foliar, fertirriego y drench, con doble propósito: suministro de cobre altamente asimilable e inducción de los mecanismos de defensas internas del cultivo.

BENEFICIOS

- Promueve las defensas naturales y potencia el sistema inmunológico de los cultivos.
- Herramienta útil en los programas de manejo integrado de enfermedades.
- Previene y corrige deficiencias de cobre.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

Composición

Sulfato de cobre pentahidratado*	250 g/L
*Cobre metálico equivalente	6.5% p/v
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble (SL)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda realizar aplicaciones a lo largo de la campaña, sobre todo en épocas donde se tenga una mayor presión de ataque de hongos y se requiera elevar las defensas del cultivo.

Cultivo	Dosis		Momento de aplicación
	L/200 L	L / Ha	
Alcachofa	-	0.5 - 0.7	Iniciar las aplicaciones después del trasplante y repetir cada 15 días.
Arroz	-	0.3 - 0.7	Iniciar las aplicaciones después del trasplante y repetir cada 15 días.
Cebolla y ajo	2 - 5	0.5 - 0.7	Comenzar las aplicaciones en la fase inicial del cultivo, repetir en prebulla.
Palto, limón, mandarina y naranja	2 - 5	0.3 - 0.5	Iniciar las aplicaciones después de poda, repetir en brotación, floración y fructificación.
Duraznero	2 - 5	0.5 - 0.7	Aplicar después de cosecha y al inicio del brotamiento.
Tomate, ají y pimiento	-	0.35 - 0.7	Aplicar 25 - 30 días después de la siembra, repetir 15 a 20 días después.
Frijol, arveja y holantao	-	0.35 - 0.7	Iniciar las aplicaciones 15 días después de la siembra.
Papa	-	0.5 - 0.7	Aplicar 20 días después de la siembra y antes del aporque.
Vid	2 - 5	0.35 - 0.7	Aplicar después de la cosecha y al inicio del brotamiento.
Banano	-	0.4 - 0.7	Iniciar las aplicaciones después del brotamiento.
Café y cacao	-	0.35 - 0.7	Aplicar durante el brotamiento y desarrollo del fruto.
Arándano	2 - 5	0.35 - 0.7	Aplicar después de la poda, en etapa de floración y desarrollo de los frutos.
Limon tahiti	2 - 5	0.35 - 0.7	Iniciar las aplicaciones después de la poda, repetir en brotación, floración y fructificación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas. No mezclar productos fuertemente ácidos ni fosetyl aluminio. No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf: (01) 336 5428
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

