

Ingrediente activo	Azufre 500 g/L Oxicloruro de cobre 79 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L
Grupo químico	Inorgánicos
Formulación	Suspensión Concentrada (SC)
Registro PQUA	N° 4153-SENASA
Formulador	Aris Industrial S.A.
Procedencia	Perú
Cat. Toxicológica	IV Ligeramente peligroso

DESCRIPCIÓN

- Fungicida de acción múltiple sobre hongos.
- Inhibe la germinación y crecimiento de los hongos.
- Bloquea el proceso respiratorio, inhibe la síntesis de proteínas y reduce la actividad de la membrana celular de los hongos.
- S+COP se destaca por su fórmula única que incluye oxicloruro de cobre, un compuesto reconocido por su acción antifúngica.

APLICACIONES

S+COP se aplica en aspersión con cualquier tipo de pulverizador accionado manual o mecánicamente; se prepara una mezcla previa, llene el tanque hasta la mitad con agua, agregue la dosis recomendada, agitar y completar el tanque con agua.



Imagen referencial.

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/200L	PC	LMR
	Nombre Científico	Nombre común			
Alcachofa	<i>Botrytis cinerea</i>	Moho gris	0.5 – 0.75	N.A	20*
Alfalfa	<i>Alternaria alternata</i>	Mancha negra de la hoja	0.75 – 1.0	N.A	ND*
Arándano	<i>Botrytis cinerea</i>	Moho gris	0.5 – 0.75	N.A	5*
Café	<i>Hemileia vastatrix</i>	Roya	0.75 – 1.0	N.A	50*
	<i>Cercospora coffeicola</i>	Cercospora	0.75 – 1.0	N.A	50*
Cebolla	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Mancha púrpura	0.75 – 1.0	N.A	0*
Espárrago	<i>Stemphylium vesicarium</i>	Mancha del peral	0.75 – 1.0	N.A	5*
Maíz	<i>Phyllachora maydis</i>	Mancha negra del maíz	0.75 – 1.0	N.A	10*
Mango	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Antracnosis	0.75 – 1.0	0	20*
Melón	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	Oidiosis	0.5 – 0.75	N.A	5*
Pimiento	<i>Leveillula taurica</i>	Oidium	0.75 – 1.0	3	5*

ARIS

S+COP

/ FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA

Vid	<i>Erysiphe necator</i>	Oidiosis	0.75 – 1.0	0	50*
------------	-------------------------	----------	------------	---	-----

P.C.: Período de carencia en días L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm N.A.: No aplica

Época y frecuencia de aplicación:

Se recomienda iniciar las aplicaciones ante la aparición de los primeros síntomas. Realizar 2 aplicaciones por campaña y hasta 3 aplicaciones para el cultivo de arándano como implementación de un manejo integrado de plagas.

Compatibilidad:

Incompatible con aceites minerales o vegetales. No aplicar dos semanas antes o después de haber aplicado algún tipo de aceite.

PRESENTACIONES

0.5L, 1L, 5L, 20L y 200L

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

Mantener bajo llave



Mantener en lugares secos y bajo techo



No comer, beber, ni fumar



Mantener fuera del alcance de niños y animales



Hacer uso de EPP (Ver etiqueta)

Los envases de Aris Industrial S.A. serán auditados y recibidos por CAMPO LIMPIO, para mayor información contactarse con dicha organización: www.campolimpio.org.pe

Aris Industrial S.A. garantiza que al momento de emitir esta hoja técnica el producto cumple con la especificación declarada. Es responsabilidad del comprador determinar que el producto cumple con los requisitos para su uso, incluyendo mediante la realización de pruebas de aplicación, así como de tomar todas las medidas de seguridad razonables.

Fecha de emisión: 23/06/2025 | Fecha de revisión: 19/02/2026
Versión: 01



ARIS



S+COP

FUNGICIDA

FICHA TÉCNICA