

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa; usar guantes de jebe, lavar las partes del cuerpo que estuvieran expuestas al producto y cambiarse la ropa.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Se recomienda enjuagar el envase con agua y agregar a la mezcla por aplicar. No ingerir el producto.
- Mantenga el producto en su envase original, herméticamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, bajo sombra, y lejos del alcance de los niños.
- No verter los restos del producto en cauces de agua.
- Evitar su transporte en envases inadecuados. No debe ser transportado junto a productos alimenticios y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel o la ropa: Quitar inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Lavar con abundante agua. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de presentar malestar, buscar atención médica.
- Si afecta a los ojos: Lavar inmediata y abundantemente bajo agua corriente durante al menos 15 minutos y con los párpados abiertos. En caso de presentar malestar, buscar atención médica.
- Si es ingerido: Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente abundante agua. En caso de presentar malestar, buscar atención médica.
- Si es inhalado: Trasladar a una zona ventilada y respirar aire fresco. En caso de presentar malestar, buscar atención médica.

En caso de EMERGENCIA llame a: SAMU: 106

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

Luego de usar el contenido total, enjuague el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Perfore el envase y deposítelo en el lugar destinado por la autoridad local competente para este fin.



MoLIBDENO

ALTA ABSORCIÓN

ACTIVA LA ENERGÍA, POTENCIA EL RENDIMIENTO

105 g/L
MoO₃

AGITAR ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Contenido Neto:
Lote N°:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

VITARIS MoLIBDENO es una fuente de molibdeno acomplejado de alta absorción que optimiza la eficiencia nutricional de la planta y favorece el aprovechamiento de los fotoasimilados, contribuyendo a transformar el potencial del cultivo en rendimiento y calidad. No genera manchado en los cultivos.

BENEFICIOS

- Favorece el crecimiento equilibrado, orientado a una mayor producción.
- Optimiza la movilización de fotoasimilados hacia órganos de reserva.
- Favorece condiciones óptimas para un adecuado cuajado, llenado y desarrollo uniforme.
- Contribuye al incremento de materia seca y grados Brix, favoreciendo una mejor calidad y maduración.
- Cumple con el reglamento UE, sobre metales pesados.

Composición

Oxido de molibdeno (MoO ₃)	105 g/L
Molibdeno (Mo)	70 g/L
Ácidos orgánicos	20 g/L
Formulación	Concentrado Soluble (SL)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Para aplicación foliar, diluir la dosis indicada en un recipiente previo con agua de pH óptimo entre 6 - 7; luego esta solución se lleva a cilindro o mochila según sea el caso, y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se aplica. En caso de aplicaciones vía riego la dosis debe ser 50% más de la dosis vía foliar detallada en el cuadro.

Cultivo	Dosis L/200L L/ha		Momento de aplicación
Cebolla, ajo, tomate, alcachofa, capsicum	0.35 - 0.5	0.7 - 1.5	Cebolla, ajo: Inicio de bulbificación. Repetir cada 7 días.
	0.5 - 1.0	1.0 - 2.0	Inicio de floración, cuajado y desarrollo de frutos. Repetir cada 15 días.
Trigo, maíz, arroz	0.35 - 0.5	0.7 - 1.5	Maíz: Aplicación entre V8 a V10 y prefloración. Arroz: Aplicar en punto de algodón y embuchamiento. Repetir cada 7 días.
Uva de mesa, arándano, palto, mandarina, limón, mango, pitahaya	0.35 - 0.5	1.0 - 2.0	Uva de mesa: Prefloración y cuajado inicial. Arándano: Aplicar en botón floral, prefloración y caída de pétalos. Palto: Aplicar en etapa coliflor, prefloración e inicio de cuajado. Mandarina: Aplicar en botón blanco, en floración y cuajado de fruto.
Café, cacao, algodón, caña de azúcar	0.5 - 0.75	1.0 - 2.0	Café: Aplicar en diferenciación floral y cuajado. Cacao: Aplicar en inicio de floración. Caña de azúcar: Aplicar en inicio de macollamiento, máximo crecimiento vegetativo e inicio de maduración.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Es compatible con la mayoría de los fertilizantes y productos fitosanitarios normalmente utilizados, tanto para la aplicación vía sistema de riego o foliar. No se han reportado problemas de fitotoxicidad a las dosis recomendadas

FORMULADO Y DISTRIBUIDO EN PERÚ POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A. | RUC: 20100257298
Av. Industrial 491 Lima - Perú | Telf: (01) 336 5428
vquimicos@aris.com.pe | www.aris.com.pe

